# Корь: симптомы и профилактика

Является одной из самых заразных болезней, известных на сегодня

## СИМПТОМЫ КОРИ

**От 7 до 14 дней** длится инкубационный период, т.е. время от заражения до появления первых симптомов



**Если человек, ранее корью не болевший и не привитый, будет контактировать с больным корью, вероятность заболеть практически 100%**

**Важно помнить, что болезнь начинается не с появления сыпи, а с симптомов простуды:**

1. Температура 38-40°С
2. Резкая слабость
3. Отсутствие аппетита
4. Сухой кашель
5. Насморк
6. Позже появляется конъюнктивит

**Корью чаще болеют дети**

**Через 2-4 дня:**

На слизистой оболочке щек (напротив коренных зубов) возникают мелкие беловатые высыпания

**На 3-5-й день:**

Кожа покрывается сыпью в виде ярких пятен, которые могут сливаться между собой. Сначала сыпь появляется за ушами и на *лбу*, затем быстро распространяется ниже на лицо, шею, тело и конечности

**На 6-8-й день:**

Максимальное высыпание, температура может подниматься до

**40,5°С**

**Надежным и эффективным методом профилактики кори является вакцинация**

## ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- Путь передачи инфекции — воздушно-капельный
- Источник инфекции — больной корью, который заразен для окружающих с последних двух дней инкубационного периода до 4-го дня высыпаний

  С 5-го дня высыпаний больной считается незаразным

## ЧТО ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ВЫ

- При малейшем подозрении на корь следует незамедлительно обратиться к врачу

  Не занимайтесь самолечением: при первых признаках заболевания обратитесь к врачу!

## ЧТО СДЕЛАЕТ ВРАЧ

- Лечение неосложненной кори: постельный режим, обильное питье, жаропонижающие, средства от насморка и боли в горле, отхаркивающие препараты, витамины
- В случае развития осложнений кори дальнейшее лечение проводят в стационаре

## ОСЛОЖНЕНИЯ

Осложнения развиваются чаще у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых старше 20 лет. Наиболее распространенными являются воспаление среднего уха (отит), слепота, бронхопневмония, воспаление шейных лимфоузлов, ларингит, энцефалит

Редактор: Акар Алиалаева. Дизайнер: Данияр Сулайманов
Источник: по материалам открытых источников

SPUTNIK

- до появления противокоревой прививки болезнь уносила более 2 млн жизней в год
- восприимчивость людей к вирусу кори крайне высока
- заболевание корью страшно своими ОСЛОЖНЕНИЯМИ

# Осторожно, корь!

СИМПТОМЫ:
- лихорадка
- слабость
- недомогание
- распространенная по телу сыпь
- поражение дыхательных путей и глаз

## Самый эффективный способ профилактики - прививка

Она необходима:

детям от 12 до 18 месяцев

-взрослым, не делавшим прививку в детстве;
-взрослым с низким количеством антител к кори в крови (можно измерить, сдав анализ)

## Осложнения при кори:

- тяжелое воспаление легких (пневмония)
- серьезные заболевания нервной системы (менингит, энцефалит)
- воспаление среднего уха (отит, евстахиит)
- поражение гортани (ларингит)
- хронические заболевания кишечника

**Осложнения способны привести к смерти и инвалидизации!**

# Внимание: корь

**Источник кори:**
больной человек.

**Температура до 40 °C**



**Клиническая картина:**

- насморк;
- конъюнктивит;
- сыпь.

**Возможные осложнения:**

- отит;
- гайморит;
- поражение роговицы глаз;
- энцефалит;
- пневмония.

**Иммунизация — основная защита от кори!**

**Дети:** вакцинация в один год, ревакцинация в шесть лет.

**Ранее не привитые и не болевшие корью взрослые (18–55 лет):** две прививки с интервалом не менее трех месяцев. Устойчивый иммунитет формируется после двукратного введения вакцины.

При первых признаках заболевания у себя или ближайшего окружения немедленно обратитесь в медучреждение.

СИМПТОМЫ
РОЗОВЫЕ ГЛАЗА
КАШЕЛЬ
СОНЛИВОСТЬ
СЫПЬ НА КОЖЕ
НАСМОРК
ПОТЕРЯ АППЕТИТА
ЛИХОРАДКА
ПЯТНА ВО РТУ
КОРЬ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ВАКЦИНАЦИЯ
ОСЛОЖНЕНИЯ
ГЛУХОТА
E
FP
TOZ
LPED
СЛЕПОТА
ПНЕВМОНИЯ
СМЕРТЬ

# ДИФТЕРИЯ

## СИМПТОМЫ

- Наиболее характерный симптом – серо-белые пленочные налёты на нёбе, миндалинах, задней стенке глотки.
- Боль при глотании
- Повышение температуры
- Увеличение миндалин или лимфоузлов
- Отёчность шеи
- Специфический запах изо рта

## ОСЛОЖНЕНИЯ

- Инфекционно-токсический шок
- Поражение нервных окончаний
- Параличи, преимущественно нёба, голосовых связок, дыхательных путей, шеи
- Почечная недостаточность
- Сердечная недостаточность
- Летальный исход

## Лечение

Антитоксическая противодифтерийная сыворотка + приём антибиотиков

## ПРОФИЛАКТИКА

- Прививка АКДС, АДС, АДС-М
- Детям в 2, 4, 6 месяцев, затем в 18 месяцев, в 6 и в 16 лет
- Взрослым – каждые 10 лет

# ДИФТЕРИЯ

## Пути заражения:

- Воздушно-капельный

- Контактно-бытовой

## Симптомы:

- Повышенная температура
- Общая слабость
- Боль в горле

- Затрудненное дыхание
- Отек и характерные пленки на слизистой
- Отек шеи

## Осложнения:

- Тяжелые поражения сердца и почек
- Поражение нервной системы (параличи, парезы)

- Инфекционно-токсический шок
- Летальный исход

## Чтобы избежать заражения:

1. Пройти обследование, чтобы определить иммунитет к дифтерии
2. Делать прививки детям, согласно календарю прививок, и прививаться каждые 10 лет.

bigmir)net

# ЕСТЬ ВАКЦИНА! ДИФТЕРИЯ

Дифтерия - инфекционное заболевание с летальностью до

**10%**

даже в случае правильного лечения

Осложнения: асфиксия вследствие закрытия просвета дыхательных путей отеком и пленками, миокардит, полинейропатия, паралич, почечная недостаточность

Эпидемия дифтерии среди непривитого населения России привела к смерти

**>4000**

человек в 90-е годы XX века

Симптомы: повышение температуры, сухой кашель, охриплость голоса, боли в горле, образование пленчатых налётов на миндалинах и нёбе

Необходима ревакцинация против дифтерии взрослых каждые

**10**

лет

Вакцинация - самая эффективная мера профилактики дифтерии; проводится трехкратно детям в 3, 4,5 и 6 месяцев с ревакцинациями в 18, 6-7 и 14 лет